

インフルエンザ予防接種 予診票

任意接種用

※接種希望の方は、太ワク内をご記入ください。

※お子様の場合は、健康状態をよく把握している保護者をご記入ください。

住所	〒	診察前の体温	度	当院診察券番号 NO
フリガナ		TEL () -		
予防接種を受ける人の氏名	男・女	生年月日: 大正・昭和・平成・西暦		
(保護者の氏名)		年 月 日生 (歳 カ月)		

質問事項		回答欄		医師記入欄
1	今日受けられる予防接種について説明文(2枚目)を読んで理解しましたか。	いいえ	はい	
2	今日受けられるインフルエンザの予防接種は今シーズン1回目ですか。	いいえ(回目)※前は 月 日	はい	
3	今日、体に具合の悪いところがありますか。	ある(具体的に)	ない	
4	現在、何かの病気で医師にかかっていますか。	はい(病名) 薬はのんでいますか(いる・いない)	いいえ	
5	最近1ヵ月以内に熱が出たり、病気にかかりましたか。	はい(病名)	いいえ	
6	今までに特別な病気(心臓血管系・腎臓・肝臓・血液疾患・免疫不全症・その他の病気)にかかり医師の診察を受けていますか。 (“いる”の場合)→その主治医に、今日の予防接種を受けてよいと言われましたか。	いる(病名)	いない	
7	これまで間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患と診断され、現在、治療中ですか。	はい 年 月ごろ (現在治療中・治療していない)	いいえ	
8	近親者に先天性免疫不全と診断された方がいますか。	はい	いいえ	
9	今までにけいれん(ひきつけ)をおこしたことがありますか。	ある 回ぐらい 最終は 年 月ごろ	ない	
10	薬や食品(鶏肉、鶏卵など)で皮膚に発しんやじんましんが出たり、体の具合が悪くなったことがありますか。	ある(薬または食品の名前)	ない	
11	これまでに予防接種を受けて特に具合が悪くなったことがありますか。	ある(予防接種名・症状)	ない	
12	1ヵ月以内に家族や周囲で麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜなどにかかった方がいますか。	いる(病名)	いない	
13	最近1ヵ月以内に予防接種を受けましたか。	はい(予防接種名:)	いいえ	
14	(女性の方に)現在妊娠していますか。	はい	いいえ	
15	(接種を受けられる方がお子さんの場合) 分娩時、出生時、乳幼児健診などで異常がありましたか。 出生体重()g	ある(具体的に)	ない	
16	今日の予防接種について質問がありますか。	ある(具体的に)	ない	

医師記入欄: 以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は(実施可能 ・ 見合わせる)
本人または保護者に対して、予防接種の効果、副反応及び医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について説明した。

医師の署名又は記名押印

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で接種を希望しますか。
(接種を希望します ・ 接種を希望しません)

本人の署名(もしくは保護者の署名) _____

※自筆できない場合は代筆者が署名し、代筆者氏名および被接種者との続柄を記載してください。
(続柄)

使用ワクチン		用法・用量	実施場所・医師名・接種日時
インフルエンザHAワクチン	Lot.No.	皮下接種	実施場所: 千葉ポートメディカルクリニック
<input type="checkbox"/> デンカ <input type="checkbox"/> 生研 <input type="checkbox"/> 阪大微研会 <input type="checkbox"/> 化血研		<input type="checkbox"/> 0.5mL(3歳以上) <input type="checkbox"/> 0.25mL(6ヵ月以上3歳未満)	医師名: 今村貴樹 接種日時: 令和 年 月 日

インフルエンザワクチンの接種について

インフルエンザの予防接種を実施するにあたって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、予防票は出来るだけ詳しくご記入ください。お子様の場合には、健康状態をよく把握している保護者の方がご記入ください。

【ワクチンの効果と副反応】

予防接種により、インフルエンザ感染を予防したり、症状を軽くすることができます。また、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれることがあります。通常は2～3日で消失します。発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐・嘔気、下痢、食欲減退。関節痛、筋肉痛なども起こることがありますが、通常は2～3日で消失します。過敏症として、発しん、じんましん、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみなどもまれに起こります。強い卵アレルギーのある方は、強い副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出て下さい。非常にまれですが、次のような副反応が起こることがあります。

(1)ショック、アナフィラキシー(蕁麻疹、呼吸困難、血管浮腫等)、(2)急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(4)けいれん(熱性けいれんを含む)、(5)肝機能障害、黄疸、(6)喘息発作、(7)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(8)血管炎(アレルギー性紫斑病、アレルギー性肉芽腫性血管炎、白血球破砕性血管炎等)、(9)間質性肺炎、(10)脳炎・脳症、脊髄炎、(11)皮膚性粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、(12)ネフローゼ症候群。

このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出て下さい。なお、健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人又は家族が、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

【予防接種をうけることができない人】

1. 明らかに発熱のある人(37.5度を超える人)
2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
3. 過去にインフルエンザの接種をうけて、アナフィラキシーを起こしたことがある人

なお、他の医薬品投与を受けてアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて判断を仰いで下さい。

4. その他、医師が予防接種をうけることが不相当と判断した人

【予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人】

1. 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
2. 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
3. カゼなどのひきはじめと思われる人
4. 予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発しん、じんましんなどのアレルギーを疑う異常がみられた人
5. 薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発しんが出たり、体に異常を来したことがある人
6. 今までにけいれんを起こしたことがある人
7. 過去に本人や近親者で検査によって免疫状態の異常を指摘されたことがある人
8. 妊娠の可能性のある人
9. 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患のある人

【予防接種を受けた後の注意】

1. インフルエンザワクチンを受けたあと30分間は、急な副反応が起きることがあります。医療機関にいるなどして様子を観察し、医師とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
2. 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。
3. 接種当日は、接種部位を清潔に保ち、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
4. 万一、高熱やけいれん等の異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。

当日接種予定の皆様へ

◆問診票をダウンロードしてご記入の上、ご持参下さい。

◆母子手帳に「予防接種」を記録されている方は、当日ご持参下さい。ワクチンロットシールをお貼りします。窓口でお出し下さい。

あなたの接種予定日

1回目接種 月 日(曜日) 午前・午後・夜間

2回目接種 月 日(曜日) 午前・午後・夜間

医療機関名:千葉ポートメディカルクリニック

TEL 043-238-1717